

レジメン名	CBDCA+ETP (VP16)	CBDCA(1)+ETP(VP16)(1,2,3) 【q21d】
がん種又は疾患名	小細胞肺がん	

承認されたレジメン	承認されたカスタマイズの範囲
1日目	
<本体1> デキサメタゾン 9.9mg アロキシ 1V 生食 100mL パロノセトロン0.75mg/50mL 1袋 30分	ステロイドは省略してはいけない アロキシは他の5HT3拮抗薬に変更してもよい 5HT3拮抗薬は省略してはいけない
<本体2> エトポシド 100 mg/m ² 5%ブドウ糖 500mL 120分	250mL/時(約120分)で注入 エトポシド濃度が 0.4mg/mL 以下になる輸液量とする
<本体3> カルボプラチン AUC 5 生食 250mL 90分	全量250mLに調節 (CBDCA量に合わせて生食を抜く)
<本体4> YDソリタT3 500mL 100分	300mL/時(約100分)で注入
<本体5> ハパリンNaロック用シリンジ 10mL 1筒	ロック用
2日目・3日目	
<本体1> デキサメタゾン 6.6mg 生食 100mL 30分	ステロイドは経口に変更してもいいが、省略してはいけない
<本体2> エトポシド 100 mg/m ² 5%ブドウ糖 500mL 120分	250mL/時(約120分)で注入 エトポシド濃度が 0.4mg/mL 以下になる輸液量とする
<本体3> YDソリタT3 500mL 100分	300mL/時(約100分)で注入
<本体4> ハパリンNaロック用シリンジ 10mL 1筒	ロック用