

レジメン名	CBDCA+CPT-11療法	CBDCA(1)+CPT-11 (1,8,15) 【q28d】
がん種又は疾患名	小細胞肺癌	

day1	承認されたレジメン	承認されたカスタマイズの範囲
<本体 1>	生食 50mL アロキシン 1V デキサメタゾン 9.9mg パロノセトロン0.75mg/50mL 1袋 6分	ステロイドは省略してはいけない 5-HT3拮抗薬は省略してはいけない
<本体 2>	ブドウ糖5% 250mL イリノテカン 60mg/m ² 60分	患者の状態に応じて適宜減量してよい
<本体 3>	ブドウ糖5% 250mL カルボプラチン AUC 5 60分	250mL以上の生食またはブドウ糖液で30分以上かけて投与 調製後は8時間以内に投与を終了すること
<本体 4>	生食 50mL 6分	フラッシングのために必須 投与速度は約500mL/h rで
day 8, 15		
<本体 1>	生食 50mL 6分 アロキシン 1V デキサメタゾン 9.9mg パロノセトロン0.75mg/50mL 1袋	ステロイドは省略してはいけない 5-HT3拮抗薬は省略してはいけない
<本体 2>	イリノテカン 60mg/m ² ブドウ糖5% 250mL 60分	患者の状態に応じて適宜減量してよい
<本体 3>	生食 50mL 6分	フラッシングのために必須 投与速度は約500mL/h rで
day2,3,9,10,16,17		
<内服>	デカドロン錠 8mg 分2 朝・昼食後	* 投与後2、3日目のステロイド (デカドロン8mg/day：経口)を投与する (遅発性の制吐目的)。