

レジメン名	CDDP+CPT-11	CDDP(1)+CPT-11(1,8,15) 【q28d】
がん種又は疾患名	小細胞肺癌	

承認されたレジメン	承認されたカスタマイズの範囲
0日目(レジメンシステムでは1病日表記)	
<本体1> YDソリタT3 500mL 100分	300mL/時(約100分)で注入 前日ハイドレーション
<本体2> YDソリタT3 500mL 100分	300mL/時(約100分)で注入 前日ハイドレーション
1日目(レジメンシステムでは2病日表記)	
<内服> イメンドカ [®] セルセット 1枚 初日 実施の1時間以上前に内服 2~3日目 朝食後内服	
<本体1> YDソリタT3 500mL 100分	前投与の水負荷は他のIVH等でも代用できる 300mL/時(約100分)で注入 水負荷の前投与は最低500mLとする
<本体2> デキサメタゾン 9.9mg アロキシー 1A 生食 100mL パロノセトロン0.75mg/50mL 1袋 30分	ステロイドは省略してはいけない 5HT3拮抗薬は省略してはいけない
<本体3> イリノテカン 60 mg/m ² 5%ブドウ糖 250mL 60分	患者の状態に応じて適宜減量してよい
<本体4> 生食 500 mL 100分	300mL/時(約100分)で注入
<本体5> マンニトール 300mL 45分	400mL/時(約45分)で注入
<本体6> シスプラチン 60 mg/m ² 生食 500 mL 120分	全量500mLに調節 (CDDP量に合わせて生食を抜く)
<本体7> フィジオ140輸液500mL 100分	300mL/時(約100分)で注入
<本体8> YDソリタT3 500mL 100分	300mL/時(約100分)で注入
<本体9> ヘパリンNa [®] ク用シリンジ 10mL 1筒	ロック用
8日目・15日目(レジメンシステムでは9, 16病日表記)	
<本体1> デキサメタゾン 9.9mg アロキシー 1A 生食 100mL パロノセトロン0.75mg/50mL 1袋 30分	ステロイドは経口に変更してもいいが、省略してはいけない 4日目以降のステロイドは必要に応じて投与する (注射または経口投与)
<本体2> イリノテカン 60 mg/m ² 5%ブドウ糖 250mL 60分	患者の状態に応じて適宜減量してよい
<本体3> 生食 50mL 6分	
day2,3,9,10,16,17	
<内服> デカドロン錠 8mg 分2 朝・昼食後	* 投与後2、3日目のステロイド (デカドロン8mg/day:経口)を投与する (遅発性の制吐目的)。