

レジメン名	CDDP+PEM	CDDP(1)+PEM(1) 【q2 1 d】
がん種又は疾患名	非小細胞肺癌 悪性胸膜中皮腫	

承認されたレジメン	承認されたカスタマイズの範囲
0日目(レジメンシステムでは1病日表記)	
<本体1> YDソリタT3 500mL 100分	300mL/時(約100分)で注入 前日ハイドレーション
<本体2> YDソリタT3 500mL 100分	300mL/時(約100分)で注入 前日ハイドレーション
1日目(レジメンシステムでは2病日表記)	
<内服> イメンドガブセルセット 1枚 初日 実施の1時間以上前に内服 2~3日目 朝食後内服	
<本体1> YDソリタT3 500mL 100分	前投与の水負荷は他のIVH等でも代用できる 300mL/時(約100分)で注入 水負荷の前投与は最低500mLとする
<本体2> デキサメタゾン 9.9mg アロキン 1A 生食 100mL パロノセトロン0.75mg/50mL 1袋 30分	ステロイドは省略してはいけない アロキンは他の5HT3拮抗薬に変更してもよい 5HT3拮抗薬は省略してはいけない
<本体3> アリムタ 500mg/m ² 生食 100mL 12分	患者の状態に応じて適宜減量してよい
<本体4> 生食 500 mL 100分	300mL/時(約100分)で注入
<本体5> マンニトール 300mL 45分	400mL/時(約45分)で注入
<本体6> シスプラチン 75 mg/m ² 生食 500 mL 120分	全量500mLに調節 (CDDP量に合わせて生食を抜く)
<本体7> フィジオ140輸注500mL 100分	300mL/時(約100分)で注入
<本体8> YDソリタT3 500mL 100分	300mL/時(約100分)で注入
<本体9> ヴァリンNaロック用シリンジ 10mL 1筒	ロック用
day2,3	
<内服> デカドロン錠 8mg 分2 朝・昼食後	* 投与後2、3日目のステロイド (デカドロン8mg/day:経口)を投与する (遅発性の制吐目的)。