

レジメン名	ヘム7 012 マ7 +EC療法	ヘム7 012 マ7 (1)+EPI(1)+CPA(1) 【q21d】
がん種又は疾患名	乳癌	

承認されたレジメン	承認されたカスタマイズの範囲
d a y 1	
<内服> イメンドカブ セット 1枚 初日 実施の1時間以上前に内服 2~3日目 朝食後内服	
<本体1> パロノセトロン0.75mg/50mL 1袋 デキサメタゾン 9.9mg 30分 ※7フィルター付き点滴ラインを使用	ステロイドは省略してはいけない
<本体2> 生食 100m L 30分 キイトルーダ 200m g	希釈後の最終濃度は1-10mg/mLとする 200mg/body
<本体3> 生食 50m L 6分	フラッシングのために必須
<本体4> エピルピシン 90mg/m ² 生食 50mL 6分	* 総投与量が900mg/m ² を超えると心毒性のリスク増大のため 総投与量をチェックする
<本体5> 生食 50mL 6分	
<本体6> エンドキサン 600mg/m ² 生食 250mL 60分	
<本体7> 生食 50mL 6分	フラッシング
d a y 2, 3, 4	
<内服> デカドロン錠 8mg 分2 朝・昼食後	* 投与後2、3、4日目のステロイド (デカドロン8mg/day：経口) を投与する (遅発性の制吐目的)。