

レジメン名	イリノテカンB療法	CPT-11 (1, 15, 29) 【q49d】
がん種又は疾患名	胃がん・結腸がん・直腸がん	CPT-11 (1, 15) 【q35d】

承認されたレジメン	承認されたカスタマイズの範囲
day 1, 15, 29	
<本体1> パロノセトロン0.75mg/50mL 1袋 30分 デキサメタゾン 9.9mg 生食 100mL	制吐剤は他の5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬で代用してもよい * イリノテカン投与後（投与後2,3日目）のステロイド （デキサメタゾン9.9mg/day：経口または注射） （遅発性の制吐目的）。
<本体2> イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup> ソルアセトF 500mL 90分	患者の状態に応じて適宜減量してよい 500mL以上の生食、ブドウ糖液、電解質輸液に 変更してもよい
<本体3> 生食 50 mL 15分	患者の状態に応じて他の輸液にかえてもよい。 血管保護のため必ず、何かを流す。
day 2, 3 16, 17 30, 31	
<内服> デカドロン錠 8mg 分2朝・昼食後	2,3日目のステロイドは注射薬に変更してもよい * 投与後2、3日目のステロイド （デカドロン8mg/day：経口）を投与する （遅発性の制吐目的）。