

レジメン名	T C療法	P A C (1) + CBDCA(1) 【q 2 1 d】
がん種又は疾患名	非小細胞肺癌	

承認されたレジメン	承認されたカスタマイズの範囲
day1	
<本体 1 > 生食 80mL デキサメタゾン 16.5mg ファモチジン20mg 1A ポララミン注 1A パロノセトロン0.75mg/50mL 1袋 *フィルター付き点滴ラインを使用 30分で	ステロイドとファモチジンは省略しない アロキンは他の5-HT3拮抗薬に変更してもよい
<本体 2 > 生食 100mL 30分で	血管保護のため必ず何かを流す
<本体 3 > 5%ブドウ糖 500mL パクリタキセル 210mg/m ² 3時間で	生食 500mLでも良い
<本体 4 > 5%ブドウ糖 250mL カルボプラチン AUC 6 1時間で	250mL以上の生食またはブドウ糖液で30分以上かけて投与 調製後は8時間以内に投与を終了すること
<本体 5 > 生食 50mL 6分で	血管保護のため必ず何かを流す
day2,3	
<内服> デカドロン錠 8mg 分2 朝・昼食後	* 投与後2、3日目のステロイド (デカドロン8mg/day：経口) を投与する (遅発性の制吐目的)。