

レジメン名	CBDCA+PEM+BEV療法	CBDCA(1)+PEM (1) +BEV (1) 【q21d】
がん種又は疾患名	非小細胞肺癌	

承認されたレジメン		承認されたカスタマイズの範囲	
<内服>	イメンドガ <sup>®</sup> セルセット 1枚 初日 実施の1時間以上前に内服 2~3日目 朝食後内服		
<本体 1>	生食 100mL アロキシン 1V デキサメタゾン 6.6mg パロノセトロン0.75mg/50mL 1袋30分		他の5HT3拮抗薬に変更してもよい 他のシロイド <sup>®</sup> に変更してもよい 投与速度は約200mL/h rで
<本体 2>	生食 100mL アリムタ 500mg/m <sup>2</sup> 12分		投与速度は約500mL/h rで
<本体 3>	生食 50mL 10分		フラッシングのために必須 投与速度は約300mL/h rで
<本体 4>	生食 250mL カルボプラチン AUC5 60分		250mL以上の生食またはブドウ糖液で30分以上かけて投与 調製後は8時間以内に投与を終了すること
<本体 5>	生食 50mL 6分		フラッシングのために必須 投与速度は約500mL/h rで
<本体 6>	生食 100mL アバスチン 15mg/kg (全量が 100mLになるように生食を抜く) 初回 90分 2回目 60分 3回目以降 30分 とすることができる		必ず生食で。
<本体 7>	生食 50mL 6分		フラッシングのために必須 投与速度は約500mL/h rで