

レジメン名	Cmab + FOLFIRI療法	Cmab (1, 8) + CPT11 (1) + 5FU (1) 【q14d】
がん種又は疾患名	進行・再発の結腸・直腸癌	

承認されたレジメン			
day 1			
<本体1>	デカドロン アロキシ ポララミン 生食	9.9mg 1V 1A 100mL	30分
<本体2>	アービタックス 生食	400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降) 250mL	初回 120分 2回目以降 60分
<本体3>	生食	50mL	アービタックス投与と同じ速度で
<本体4>	イリノテカン 5%ブドウ糖	150mg/m ² 500mL	90分 レボホリナートと同時開始
<側管>	レボホリナート 5%ブドウ糖	200mg/m ² 250mL	2時間
<本体5>	5-FU 5%ブドウ糖	400mg/m ² 50mL	全開で
<本体6>	5-FU デキサート(1.65mg) 生食	2400mg/m ² 1A 全量	140mLになるように 46時間
day 2,3			
<内服>	デカドロン錠	8mg	分2 朝・昼食後
day 3			
<本体1>	ヘパリンNaロック用シリンジ	1筒	本体終了時
day 8			
<本体1>	デカドロン ポララミン 生食	8mg 1A 100mL	30分
<本体2>	アービタックス 生食	250mg/m ² 250mL	60分
<本体3>	生食	50mL	アービタックス投与と同じ速度で