

レジメン名	BEP療法	CDDP(1-5)+ETP(1-5)+BLM(2,9,16)【q21d】
がん種又は疾患名	精巣がん	

承認されたレジメン			
0日目			
<本体1>	ビカーボン	500mL × 3	6時間
1日目			
<本体1>	ソルデム1号	500mL	2時間
<本体2>	デキサメタゾン アロキシ 生食	13.2mg 1A 100mL	15分
<本体3>	エトポシド 生食	100 mg/m <sup>2</sup> 500mL	2時間
<本体4>	マンニトール	300mL	30分
<本体5>	シスプラチン 生食	20 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	2時間
<本体6>	フィジオ35 7%メイロン静注	500mL 40mL	2時間
<本体7>	フィジオ35 7%メイロン静注	500mL 40mL	2時間
<本体8>	ソルデム1号	500mL	翌日までkeep
2日目			
<本体1>	ソルデム1号	500mL	2時間
<本体2>	デキサメタゾン 生食	13.2mg 100mL	15分
<本体3>	ブレオ 生食	30 mg/body 100mL	30分
<本体4>	エトポシド 生食	100 mg/m <sup>2</sup> 500mL	2時間
<本体5>	マンニトール	300mL	30分
<本体6>	シスプラチン 生食	20 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	2時間
<本体7>	フィジオ35 7%メイロン静注	500mL 40mL	2時間
<本体8>	フィジオ35 7%メイロン静注	500mL 40mL	2時間
<本体9>	ソルデム1号	500mL	翌日までkeep
3日目・4日目・5日目			
<本体1>	ソルデム1号	500mL	2時間

<本体2>	デキサメタゾン 生食	13.2mg 100mL	15分
<本体3>	エトポシド 生食	100 mg/m <sup>2</sup> 500mL	2時間
<本体4>	マンニトール	300mL	30分
<本体5>	シスプラチン 生食	20 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	2時間
<本体6>	フィジオ35 7%メイロン静注	500mL 40mL	2時間
<本体7>	フィジオ35 7%メイロン静注	500mL 40mL	2時間
<本体8>	ソルデム1号	500mL	翌日までkeep
6日目・7日目			
<本体1>	デキサメタゾン 生食	13.2mg 100mL	15分
<本体2>	フィジオ35	500mL × 3	6時間
8日目			
<本体1>	フィジオ35	500mL × 3	6時間
9日目・16日目			
<本体1>	ソルデム1号	500mL	2時間
<側管1>	ソルコーテフ(100mg) 生食	1V 100mL	15分
<側管2>	ブレオ 生食	30 mg/body 100mL	30分