

レジメン名	Bmab+CBDCA+PAC療法	Bmab(1) + P A C (1) + CBDCA(1) 【q21d】
がん種又は疾患名	非小細胞肺癌	

承認されたレジメン	承認されたカスタマイズの範囲
day1	
<本体1> 生食 80mL デキサメタゾン 16.5mg ポララミン注 1A ファモチジン20mg 1A アロキソ 1A パロノセトロン0.75mg/50mL 1袋 *フィルター付き点滴ラインを使用 30分	ステロイドとファモチジンは省略しない
<本体2> 生食 100mL 30分	血管保護のため必ず何かを流す
<本体3> 5%ブドウ糖 500mL パクリタキセル 200mg/m ² 3時間で	
<本体4> 5%ブドウ糖 250mL カルボプラチン AUC 6 1時間で	250mL以上の生食またはブドウ糖液で30分以上かけて投与調製後は8時間以内に投与を終了すること
<本体5> 生食 50mL 6分	血管保護のため必ず何かを流す
<本体6> アバスチン 15mg/kg 初回 90分 生食 100mL 2回目 60分 3回目以降 30分	生食以外は使用しない 全量を100mLにする
<本体7> 生食 50mL 6分	血管保護のため必ず何かを流す
day2,3	
<内服> デカドロン錠 8mg 分2 朝・昼食後	* 投与後2、3日目のステロイド (デカドロン8mg/day：経口) を投与する (遅発性の制吐目的)。