

レジメン名	CBDCA+GEM療法	CBDCA(1)+GEM (1,8) 【q21d】
がん種又は疾患名	非小細胞肺癌	

承認されたレジメン	承認されたカスタマイズの範囲
day1	
<本体 1> 生食 50mL アロキソ 1V デキサメタゾン 9.9mg パロノセトロン0.75mg/50mL 1袋 6分	ステロイドは省略してはいけない 5-HT ₃ 拮抗薬は省略してはいけない
<本体 2> ゲムシタビン 1000mg/m ² ブドウ糖 5% 100mL 30分	患者の状態に応じて適宜減量してよい
<本体 3> カルボプラチン AUC 5 ブドウ糖 5% 250mL 60分	250mL以上の生食またはブドウ糖液で30分以上かけて投与 調製後は8時間以内に投与を終了すること 患者の状態に応じて適宜減量してよい
<本体 4> 生食 50mL 6分	フラッシングのために必須 投与速度は約500mL/h rで
day 8	
<本体 1> 生食 50mL 6分 デキサメタゾン 6.6mg	ステロイドは省略してはいけない
<本体 2> ゲムシタビン 1000mg/m ² ブドウ糖 5% 100mL 30分	患者の状態に応じて適宜減量してよい
<本体 3> 生食 50mL 6分	フラッシングのために必須 投与速度は約500mL/h rで
day 2,3	
<内服> デカドロン錠 8mg 分2 朝・昼食後	* 投与後2、3日目のステロイド (デカドロン8mg/day：経口)を投与する (遅発性の制吐目的)。

#