

レジメン名	ペムパロリスチン+CBDCA+PAC療法	ペムパロリスチン(1)+PAC(1)+CBDCA(1)【q21d】
がん種又は疾患名	非小細胞肺癌	

承認されたレジメン	承認されたカスタマイズの範囲
day1	
<本体1> 生食 80mL デキサメタゾン 16.5mg ファモチジン20mg 1A ポララミン注 1A アロキシ 1A パロノセトロン0.75mg/50mL 1袋 *フィルター付き点滴ラインを使用 30分	ステロイドとファモチジンは省略しない 5-HT3拮抗薬は省略しない
<本体2> 生食 100mL 30分 キイトルーダ 200mg	希釈後の最終濃度は1-10mg/mLとする 200mg/body
<本体3> 生食 50mL 6分	血管保護のため必ず何かを流す
<本体4> 5%ブドウ糖 500mL パクリタキセル 210mg/m ² 3時間で	
<本体5> 5%ブドウ糖 250mL カルボプラチン AUC 6 1時間で	調製後は8時間以内に投与を終了すること
<本体6> 生食 50mL 6分	血管保護のため必ず何かを流す
day2,3	
<内服> デカドロン錠 8mg 分2 朝・昼食後	* 投与後2、3日目のステロイド (デカドロン8mg/day:経口)を投与する (遅発性の制吐目的)。