

レジメン名	アテゾリズマブ + Bmab + CBDCA + PAC療法	アテゾリズマブ (1) + Bmab(1) + P A C (1) + CBDCA(1) 【q21d】
がん種又は疾患名	非小細胞肺癌	

承認されたレジメン		承認されたカスタマイズの範囲	
day1			
<本体1>	生食 50mL 6分 *フィルター付き点滴ラインを使用		
<本体2>	テセントリク 1200mg 初回 60分 生食 250mL 2回目以降 30分	生食以外は使用しない 2回目の投与時間は主治医と確認 1200mg/body	
<本体3>	生食 50mL 6分	フラッシング	
<本体4>	生食 80mL デキサメタゾン 16.5mg ポララミン注 1A ファモチジン20mg 1A アロキシン 1A パロノセトロン0.75mg/50mL 1袋 12分	ステロイドとファモチジンは省略しない	
<本体5>	生食 100mL 30分で		
<本体6>	5%ブドウ糖 500mL パクリタキセル 175mg/m ² 3時間で		
<本体7>	5%ブドウ糖 250mL カルボプラチン AUC 6 約1時間		
<本体8>	生食 50mL 6分で		
<本体9>	アバスチン 15mg/kg 初回 90分 生食 100mL 2回目 60分 3回目以降 30分	生食以外は使用しない 全量を100mLにする	
<本体10>	生食 50mL 6分で	血管保護のため必ず何かを流す	
day2,3			
<内服>	デカドロン錠 8mg 分2 朝・昼食後	* 投与後2、3日目のステロイド (デカドロン8mg/day：経口) を投与する (遅発性の制吐目的)。	