

レジメン名	RCHOP	R - C H O P 【q 21 d】
がん種又は疾患名	悪性リンパ腫	

承認されたレジメン	承認されたカスタマイズの範囲
d a y 1	
カロナール 2 錠 アタラックスP 1 カプセル リツキサン開始 3 0 分前に内服	他のNSAIDでもよい 他の抗ヒスタミン薬でもよい 省略してもよい
< 本体 1 > ソル・コーテフ 100m g 生食 100mL 30分	* 他のステロイドでもよい * infusion reaction(発熱、悪寒、頭痛) (90%の発現率) を軽減するため。
< 本体 2 > リツキサン 375m g / m ² 生食 500mL (10倍希釈となるように調製) 約 5 時間	* 投与速度は血圧降下、気管支痙攣血管浮腫を避けるために必ず輸液ポンプを使用し、投与速度を守ること。 【初回】 最初の30分: 50mg / h r (= 50mL/hr) 30分ごとに50mg/hrずつ上げて 最大 4 00mg / h r (= 400mL/hr) まで 上げることができる 【2 回目以降】 初回投与時の発現副作用が軽微だった場合 注入開始速度は、100mg / h r (= 100mL/hr) で開始し その後30分ごとに100mg / h r ずつ上げて最大400mg/hr まで上げることができる
< 本体 3 > パロノセトロン0.75mg/50mL 1袋 30分	
< 本体 4 > ドキソルビシ 50mg / m ² 生食 100mL 30分	* 総投与量はドキソルビシン塩酸塩として500mg / m ² 以下とする
< 本体 5 > オンコビン 1.4mg / m ² 生食 50mL 5分	* 注射用水、5 %ブドウ糖液に変更してもよいがこれら以外は使用しない * 2mg/bodyをこえてはいけない
< 本体 6 > エンドキサン 750mg / m ² 生食 500mL 120分	
< 本体 7 > 生食 50mL 全開	ルートフラッシュのため必須
d a y 1, 2, 3, 4, 5	
プレドニゾロン 100mg / b o d y 朝 12錠 夕 8錠 内服	